

CUIDADOS APÓS COLETA DE SANGUE



1

ORIENTAÇÕES GERAIS

Após a coleta de sangue, pode surgir um pequeno hematoma (mancha roxa ou esverdeada) no local da punção. Isso é comum e geralmente ocorre devido à fragilidade vascular, movimentação do pet, estresse prévio ou durante o procedimento ou até mesmo pela presença de hipertensão arterial.

Em geral, o hematoma desaparece sozinho em até uma semana.



O rompimento de pequenos vasos sanguíneos não representa risco ao pet, sendo um **efeito colateral leve e transitório.**



2

LOCAIS DE PUNÇÃO MAIS UTILIZADOS

A escolha do local de coleta leva em consideração o volume de sangue necessário, o temperamento do animal e o conforto durante o procedimento.



CÃES:


Veias jugular (pescoço), safena lateral (pata traseira) e, quando necessário, cefálica (pata dianteira).



GATOS:

Conforme práticas Cat Friendly, evitamos ao máximo a jugular, para reduzir o estresse e proporcionar uma experiência mais positiva ao felino.

Priorizamos as veias femoral (face interna da coxa), safena lateral (pata traseira) e cefálica.



3

O QUE FAZER EM CASA?

Nas primeiras 24h, aplique compressas frias (5 a 10 minutos, 2 vezes ao dia) para reduzir o inchaço e prevenir aumento do hematoma.

Após esse período, pode-se utilizar pomadas como Hirudoid® ou Venalot®, conforme orientação veterinária.



Função das pomadas:

Esses cremes têm ação anti-inflamatória, antitrombótica e estimulam a circulação local, auxiliando na reabsorção do sangue acumulado.

Aplique com uma massagem leve e superficial, apenas para espalhar o produto.

Evite que o animal lamba ou coce a área. Se necessário, utilize colar elizabetano.



4

NÃO É ESPERADO:



- ❌ Inchaço progressivo ou dolorido;
- ❌ Vermelhidão intensa, calor local ou secreção;
- ❌ Dor evidente ao toque;
- ❌ Hematoma persistente por mais de 07 dias.

Esses sinais, embora raríssimos, podem indicar complicações inflamatórias ou infecciosas no local da punção, como uma flebite, hematoma infectado ou, em casos mais incomuns, a formação de abscesso.

Essas alterações geralmente estão relacionadas à resposta individual do organismo do pet - especialmente em animais com maior sensibilidade vascular, imunidade comprometida ou doenças pré-existentes - e não ao procedimento em si, que é realizado com técnica e cuidado por nossa equipe.


5

RECEITUÁRIO

USO TÓPICO

1. Hirudoid pomada **OU** Venalot creme (uso humano) .. cx

Aplicar uma fina camada de Hirudoid® ou Venalot® sobre o hematoma duas vezes ao dia, realizando uma massagem suave e circular na região, até que a mancha desapareça (geralmente entre 3 e 7 dias). Evitar o uso da pomada em áreas com feridas abertas, secreção ou sinais de infecção local. Manter o local limpo e seco, sem necessidade de curativo. Em caso de dor intensa, aumento do inchaço ou persistência do hematoma por mais de 07 dias, orientamos retornar para avaliação.



Em caso de qualquer um desses sinais, nossa clínica funciona 24h por dia, sem necessidade de agendamento para atendimentos emergenciais.



Salus Brasília

CLÍNICA VETERINÁRIA

🌐 Portal de exames e retornos: simplespet.com.br

SCLN 311 bloco A loja 60 | Asa Norte, Brasília

(61) 99642-6038

@salusbrasil

salusbrasil@gmail.com

www.salusbrasil.com